

CORROBORANTE NATURALE COSTITUITO DA SILICATI, ARGILLE ACIDE (MUSCOVITE WEBSTERITE) DI ORIGINE VULCANICHE E SEDIMENTARIE.

Il processo industriale brevettato utilizzato per rendere il silicio biodisponibile consente ai vegetali di assumere elevate dosi di questo elemento che si traduce in numerosi effetti positivi: resistenza naturale delle piante a stress abiotici e biotici, miglioramento dell'evapotraspirazione e della shelf-life delle colture trattate.

AZIONE

- Asciuga l'umidità sulla superficie vegetale
- Potenzia la risposta di autodifesa delle piante alle avversità biotiche
- Rafforza la parete cellulare delle piante con l'ispessimento delle cellule dell'epidermide

CARATTERISTICHE

Formulazione	Polvere solubile
pH	3,5 - 4
Dimensione media particelle	Inferiore a 2 micron

COMPOSIZIONE

Miscela di argille acide micronizzate, composizione media minerale, Acido ortosilicico

Elemento	Si	S	CaO	MgO	Fe	Ti
% Media	40	12	1,5	0,18	0,16	0,34

DOSI E MODALITÀ D'USO

 COLTURE	 FOGLIARE	 PERIODO DI APPLICAZIONE
 Ciliegio Pesco Albicocco	4-5 kg/ha	Dall'allegagione in poi all'ingrossamento frutto
 Frutta a Guscio (Nocciolo-Castagno)	4-5 kg/ha	Ogni 10-15 gg dalla formazione frutto alla maturazione
 Olivo	5-7 kg/ha	Ripresa vegetativa - Formazione e accrescimento frutto
 Vite	5-7 kg/ha	1. Da allegagione - pre chiusura grappolo, 2. Invaiaitura grappolo
 Pomodoro	4-5 kg/ha	Dal trapianto alla ingrossamento frutto ogni 8 gg
 Cipolotto - Cipolla	3-4 kg/ha	Dalle emissioni delle prime foglie ogni 8 gg
 Rucola e Ortaggi IV Gamma	3-4 kg/ha	1. Dopo lo sfalcio, 2. Ogni 6/7 gg dalla formazione delle prime foglie vere

